# 通便灵胶囊说明书



请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 警告:本品含番泻叶,不宜超量或者长期服用。

### 【药品名称】

通用名称:通便灵胶囊

汉语拼音: Tongbianling Jiaonang

【成 份】番泻叶、当归、肉苁蓉。

【性 状】本品为胶囊剂,内容物为黑褐色的颗粒或粉末;气微,味微苦、咸。

【功能主治】泻热导滞,润肠通便。用于热结便秘,长期卧床便秘,一时性腹胀便秘,老年习惯性便秘。

【规 格】每粒装 0.25 克

【用法用量】口服,一次5~6粒,一日1次。

【不良反应】监测数据显示,本品可见以下不良反应报告:腹痛、腹泻、腹胀、腹部不适、腹鸣、恶心、呕吐、口干、反酸、烧心、食欲减退、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸。 监测数据及文献有长期服用本品致结肠黑变病的报告。

#### 【禁忌】

- 1. 孕妇禁用。
- 2. 对本品及所含成份过敏者禁用。

#### 【注意事项】

- 1. 本品含番泻叶,症状改善后可酌情减量或者停药,如出现水样便应当及时停药。
- 2. 本品不宜超量或者长期服用,不宜与番泻叶及其他含番泻叶制剂同时使用。文献报道长期服用含蒽醌类成份中药(番泻叶等)或者制剂可引起结肠黑变病。
- 3. 服药期间忌食生冷、辛辣油腻及不易消化食物。
- 4. 服药后症状无改善,或者症状加重,或者出现新的症状者,应当立即停药,必要时到医院就诊。
- 5. 年老体弱者应当在医师指导下服用。
- 6. 儿童慎用,确需使用应当在医师指导下服用。
- 7. 脾胃虚寒者慎用。
- 8. 过敏体质者慎用。
- 9. 本品性状发生改变时禁止使用。
- 10. 儿童必须在成人监护下使用。
- 11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或者药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【贮 藏】密封。

【包 装】铝塑铝包装,10粒/板,2板/盒;10粒/板,3板/盒;10粒/板,4板/盒;12粒/板,2板/盒; 12粒/板,3板/盒。

【有效期】36个月

【执行标准】中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 WS<sub>3</sub>-B-1420-93

【批准文号】国药准字 Z13021433

【说明书修订日期】2024年12月28日

【药品上市许可持有人】

企业名称:景忠山国药(唐山)有限公司

注册地址: 丰润区公园道 136 号

#### 【生产企业】

企业名称:景忠山国药(唐山)有限公司

生产地址: 丰润区公园道 136号

邮政编码: 064000

电话号码: 0315-3123888

传真号码: 0315-3123999

网 址: www. jzsgy. net

如有问题可与生产企业联系